



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
معاونت غذا و دارو

تجویز و انتخاب آنتی بیوتیک ها بر عهده پزشک است تا طی تکمیل دوره درمانی صحیح و تعداد مناسب آنتی بیوتیک ها، درمان بیمار تضمین نماید.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران
واحد تحقیق و توسعه



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
معاونت غذا و دارو

**تقریبا تمامی داروها عوارض ناخواسته ای
را ایجاد می کنند اما می توان با انتخاب
صحیح و مصرف درست آنها تحت نظر
پزشک عوارض آنها را کنترل نماییم.**

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

واحد تحقیق و توسعه

**ممکن است پس از گذشت دو یا سه روز از مصرف
آنتی بیوتیک ها علائم بیماری از بین برود اما این
به منزله بهبودی و قطع دارو نیست. دوره درمان
را مطابق تجویز پزشک کامل نمایید.**



معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

واحد تحقیق و توسعه



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
معاونت غذا و دارو

**مصرف داروهای مسکن را بدون صلاحیت علمی به دیگران
توصیه نکنید. عوارض و صدمات داروهای ضد درد و مسکن
ها از جمله عوارض کلیوی و کبدی گاه غیر قابل برگشت و
جبران ناپذیر است.**



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

واحد تحقیق و توسعه

ناپدید شدن علائم بیماری ممکن است بهترین دلیل
برای قطع مصرف دارو به حساب آید که در بسیاری از
موارد ممکن است منجر به شکست درمان گردد. توصیه
به تکمیل دوره درمان را فراموش نکنیم.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران
واحد تحقیق و توسعه

**مصرف داروهای ضد بارداری در زنان نیز خطر
لخته شدن خون، حملات قلبی و مغزی را به خصوص در
زنان سیگاری بالای ۳۵ سال شدت می بخشد.**

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

واحد تحقیق و توسعه



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت غذا و دارو

**اغلب آنتی بیوتیک ها به دلیل مشکلات کوارشی که
ایجاد می کنند بهتر است پس از غذا مصرف شوند. اما
برخی از آنها نیز باید با معده خالی مصرف شوند تا
اثرات درمانی بیشتری داشته باشند. حتما در این مورد
از پزشک یا داروساز سوال کنید.**



معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران
واحد تحقیق و توسعه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت غذا و دارو



بهترین مایع برای مصرف
آنتی بیوتیک ها، آب است اغلب
آنتی بیوتیک ها بهتر است با شیر،
آبمیوه، چای و نوشابه مصرف
نشوند.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

واحد تحقیق و توسعه



وزارت بهداشت و آموزش پزشکی
وزارت غذا و دارو

**مصرف همزمان لبنیات و مکمل های حاوی آهن ، روی و منیزیم
با آنتی بیوتیک ها اثرگذاری آنتی بیوتیک ها را کاهش می دهد.
بهترین فاصله زمانی مصرف آنتی بیوتیک ها و سایر مکمل های
دارویی حداقل ۳ ساعت است.**



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران
معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران
واحد تحقیق و توسعه



**قرصهای جلوگیری از بارداری میتواند اثر برخی از
آنتی بیوتیک ها را کاهش یا افزایش دهد.
از پزشک یا داروساز خود مشاوره بگیرید.**

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

واحد تحقیق و توسعه

با مصرف آنتی بیوتیک ها در خانم های باردار ممکن است از جفت عبور نموده و به جنین آسیب برسانند. مصرف آنتی بیوتیک در شیر دهی نیز ممکن است از شیر عبور کرده به نوزاد صدماتی را وارد نماید. حتما پزشک را در جریان بارداری و شیردهی قرار دهید.



معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

واحد تحقیق و توسعه



آنتی بیوتیک ها ممکن است باعث کاهش اثر قرص های ضد بارداری شوند. شاید لازم باشد در طول مصرف آنتی بیوتیک ها از روش های دیگر ضد بارداری هم استفاده شود .

در این مورد با پزشک
یا داروساز خود مشاوره نمایید.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

واحد تحقیق و توسعه



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت غذا و دارو



**بیماران بایستی پزشک را در جریان حساسیت های دارویی ،
بارداری و شیردهی ، مصرف سایر داروهای شیمیایی و گیاهی ،
سایر بیماریها و کلیه شرائط خاص خود قرار دهند.**

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران
واحد تحقیق و توسعه

مصرف همزمان الکل با بسیاری از داروها باعث کاهش
یا افزایش اثرات دارو و ایجاد عوارض ناخواسته
دارویی می شود. لازم است بیماران، پزشک یا داروساز
را نسبت به مصرف الکل در جریان قرار دهند.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

واحد تحقیق و توسعه



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران
معاونت غذا و دارو

عوارض آنتی بیوتیک ها
عمدتاً شامل ناراحتی های
گوارشی ، تهوع ، اسهال یا
مدفوع نرم است.

در صورت داشتن عوارض جانبی
باید با پزشک تماس گرفت.



معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

واحد تحقیق و توسعه



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت غذا و دارو

سایر عوارض احتمالی آنتی بیوتیکها عبارتند از :

دردهای شکمی ، پلاک های سفید بر روی زبان،
وجود ترشح یا خارش ناحیه تناسلی در خانم ها ،
حساسیت به نور آفتاب و واکنش های آلرژیکی

از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها پرهیزید.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

واحد تحقیق و توسعه



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت غذا و دارو